MORFUS 72 SC®

ROTAM
Expertos en tecnología Post Patente

Asproagro

NOMBRE COMÚN: Clorotalonil.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Suspensión concentrada (SC) que contiene 720 g de Ingrediente activo por litro de producto comercial.

ACCIÓN FITOSANITARIA: Fungicida de contacto, de amplio espectro, cuya formulación le permite una mayor retención en las hojas. Controla eficazmente enfermedades foliares de banano, plátano y papa. Como fungicida protectante multisitio, es ideal para ser incorporado dentro de un programa de manejo de la resistencia hacia los fungicidas sistémicos monositio.

COMPATIBILIDAD: No mezclar **MORFUS 720 SC** con aceite agrícola, el vehículo de suspensión sólo es agua. Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios.
No debe emplearse en mezcla con productos agentes tenso activos o fertilizantes, a menos que se haya comprobado previamente que la combinación es físicamente compatible, eficaz y no fitotóxica bajo las condiciones de uso local.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica IV.
DL_{50} Oral: 3 100 mg/kg
DL_{50} Dermal: >2 000 mg/kg

MODO DE EMPLEO: Para banano y plátano usar **MORFUS 720 SC** bajo condiciones normales en aplicaciones aéreas de 4-5 galones de agua por hectárea. Aplicarlo solamente con agua.
Diluya la dosis recomendada en la mitad del agua requerida finalmente completar el volumen total mientras da agitación a la mezcla.
En períodos de mayor severidad de la enfermedad, reduzca los intervalos entre aplicaciones y haga rotación con fungicidas de diferente grupo químico y mecanismo de acción.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Dependiendo de la incidencia de la enfermedad y condiciones climáticas para banano y plátano aplicar cada 10 a 21 días y para papa cada 7 a 12 días.
Papa: Se recomienda hasta 4 aplicaciones, la primera entre los 10 a 14 días, la segunda de 4 a 7 días, luego rotar con fungicidas de diferente modo de acción y luego 2 aplicaciones de **MORFUS 720 SC**.
Rosas: 3 aplicaciones cada 5 a 7 días en rotación con fungicidas de diferente modo de acción.
Tomate: Aplicar preventivamente cada 7 días cuando aparezcan los primeros síntomas.
Sandía: Aplicar preventivamente cada 7 días cuando exista hasta 2% de síntomas.

MODO DE PREPARACIÓN: Vierta el contenido en un tanque de 200 l de agua y mezclar.

PRECAUCIONES DE USO: MORFUS 720 SC causa irritación a la piel y ojos puede ser un sensibilizador potencial para la piel; use gafas y ropa protectora cuando manipule el producto. Es tóxico para peces, evite contaminar fuentes, cauces y estanque de agua, no lo aplique directamente al agua. Conservar el producto en su envase original y en un lugar cerrado fuera del alcance de los niños. No almacenar junto con alimentos, bebidas o semillas para consumo humano o animal. No emplear el envase para otro fin. Antes de destruir el envase, enjuagarlo con agua (cuarta parte del contenido) por lo menos tres veces y los residuos viértalos en el equipo de aplicación, luego dispóngalo en un vertedero controlado. En caso de derrame del producto, recoja con material absorbente (aserrín), y colocar los residuos en un recipiente adecuado para su eliminación, dispóngalo adecuadamente de acuerdo a la normatividad local.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS MÉDICOS:

SÍNTOMAS: Puede producir reacción alérgica temporal presentando enrojecimiento de los ojos, irritación bronquial leve y enrojecimiento o erupciones en el área de la piel expuesta.

DIAGNÓSTICO: Mediante pruebas de laboratorio.

TRATAMIENTO: No existe antídoto específico. Usar tratamiento sintomático.
En caso de irritación de la piel dar tratamiento antihistamínico o cremas esteroides y/o esteroides orgánicos.

PRESENTACIONES:
Frasco x 400 cc.
Frasco x 1 litro.
Envase x 5 litros.

REGISTRO MAGAP: 18 – F 36 / NA

ELABORADO POR: ROTAM.

DISTRIBUIDO POR: ASPROAGRO.